



# Condado de Santa Cruz

AGENCIA DE SERVICIOS DE SALUD  
División de Salud Pública

1070 Emeline Avenue, Santa Cruz, CA 95060  
(831) 454-7519 Fax: (831) 454-4770  
[santacruzhealth.org](http://santacruzhealth.org)



## Comunicado de Prensa

Para Publicación Inmediata  
15 de agosto de 2024

Contacto: Corinne Hyland  
(831) 566-4370

### OFICIALES DE SALUD PUBLICA ADVIERTEN SOBRE UN AUMENTO DE XILACINA ENCONTRADA EN EL CONDADO DE SANTA CRUZ

**Condado de Santa Cruz, CA** - Los Oficiales de Salud Pública del Condado de Santa Cruz están advirtiendo a los médicos locales y residentes sobre un aumento de xilacina en el suministro de drogas ilegales en el condado de Santa Cruz. La xilacina, cuando se combina con el fentanilo, se conoce como "tranq dope". La xilacina es un potente sedante diseñado para los animales como un analgésico. No es seguro para los seres humanos y puede causar somnolencia, amnesia, heridas graves en la piel, así como respiración lenta, ritmo cardíaco más bajo y una disminución de la presión arterial a niveles peligrosos que pueden conducir a la muerte.

"La xilacina se está mezclando cada vez más con las drogas de la calle, lo que lleva a un mayor riesgo de sobredosis y complicaciones graves para la salud", dijo la Dra. Lisa Hernández, Oficial de Salud del Condado de Santa Cruz. "El enfoque más seguro es evitar el uso de drogas callejeras. Manténgase lo más seguro posible: nunca consuma solo, reconozca los signos de la sobredosis, busque ayuda, y manténgase informado".

La xilacina frecuentemente se mezcla con opioides como el fentanilo y la heroína sin el conocimiento de quienes usan estas drogas. Aunque la sobredosis de xilacina no se revierte con naloxona, el medicamento que salva vidas aún debe administrarse a las personas que experimentan una sobredosis para revertir el componente opioide de la sobredosis. Llame al 911 y de respiración boca a boca si es necesario. Si hay xilacina presente, el individuo puede seguir estando muy somnoliento incluso después de recibir naloxona.

Los medicamentos que tienen xilacina presente también tienen más probabilidades de causar infecciones, abscesos o úlceras. Estas heridas se producen comúnmente en los sitios de inyección, pero cualquier método de uso de xilazina aumenta el riesgo de heridas graves en la piel. Consulte a un proveedor médico inmediatamente si tiene una herida por el uso de xilazina; manténgala limpia y cubierta para evitar infecciones.

La naloxona está aprobada por el gobierno federal para la distribución de venta libre en farmacias y está disponible de forma gratuita en muchos sitios comunitarios. Visite [www.hipscc.org/naloxone](http://www.hipscc.org/naloxone) para obtener una lista de sitios de distribución de naloxona.

Las personas que están listas para buscar tratamiento para el uso de sustancias pueden comunicarse con su proveedor de atención primaria o llamar a la División de Salud Mental y Tratamiento del Uso de Sustancias del Condado de Santa Cruz al (800) 952-2335.

Para obtener más información sobre la xilacina, visite el sitio web de [xilacina del CDPH](#) o [SafeRx del Condado de Santa Cruz](#) para obtener recursos locales.

###